

Tabla 5-1. Composición de la abundancia relativa de *Triatoma sordida*, colectada en *Butia yatay*, discriminada por clase de edad y estación. Áreas rurales de la Provincia de Corrientes, Argentina. 1998-1999.

	HUEVOS	NINFAS					ADULTOS		TOTAL
		N1	N2	N3	N4	N5	Hembra	Macho	
PRIMAVERA	17	13	20	60	57	35	4	11	217
VERANO	1	8	12	14	9	23	0	0	67
OTOÑO	0	18	21	10	18	10	1	1	79
INVIERNO	0	7	7	12	16	18	0	0	60
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>60</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>423</b>




Fig.5-1. Estructura etarea de *T.sordida* colectada en *Butia yatay* en áreas rurales de la provincia de Corrientes, Argentina. Octubre 1998.




Fig. 5-2. Estructura etarea de *T.sordida* colectada en *Butia yatay* en áreas rurales de la provincia de Corrientes, Argentina. Noviembre 1998.




Fig.5-3 . Estructura etarea de *T.sordida* colectada en *Butia yatay* en áreas rurales de la provincia de Corrientes, Argentina.Diciembre 1998.




Fig.5-4. Estructura etarea de *T.sordida* colectada en *Butia yatay* en áreas rurales de la provincia de Corrientes, Argentina. Enero 1999.




Fig.5-5. Estructura etarea de *T.sordida* colectada en *Butia yatay* en áreas rurales de la provincia de Corrientes, Argentina. Febrero 1999.




Fig. 5-6. Estructura etarea de *T.sordida* colectada en *Butia yatay* en áreas rurales de la provincia de Corrientes, Argentina. Marzo 1999.




Fig.5-7. Estructura etarea de *T.sordida* colectada en *Butia yatay* en áreas rurales de la provincia de Corrientes, Argentina. Abril 1999.




Fig.5-8. Estructura etarea de *T.sordida* colectada en *Butia yatay* en áreas rurales de la provincia de Corrientes, Argentina.Mayo 1999.




Fig.5-9. Estructura etarea de *T.sordida* colectada en *Butia yatay* en áreas rurales de la provincia de Corrientes, Argentina. Junio 1999.




Fig.5-10. Estructura etarea de *T.sordida* colectada en *Butia yatay* en áreas rurales de la provincia de Corrientes, Argentina. Julio 1999.




Fig.5-11. Estructura etarea de *T.sordida* colectada en *Butia yatay* en áreas rurales de la provincia de Corrientes, Argentina. Agosto 1999.




Fig.5-12. Estructura etarea de *T.sordida* colectada en *Butia yatay* en áreas rurales de la provincia de Corrientes, Argentina. Setiembre 1999.




Fig.5-13.Densidad poblacional de *T. sordida*, discriminada por mes de captura. Áreas rurales de la Provincia de Corrientes, Argentina.1998-1999.